

# Vanlige norske sommerfugler

Tekst og foto: Ove Bergersen



## Svalestjert

### Utseende

Blekgul grunnfarge med svarte ribbetegninger. Blått bånd på bakvingens nedre del med rød øyeflekk. Bakvingen ender i en tydelig stjert.

Vingespenn 72 -90 mm.

### Lokalitet

Fuktig myr og gressenger nær vann og skog, ofte langs skogsveier. Finnes også på tørrere områder nær kysten, da ofte på syrintrær i hager.



## Sitronsommerfugl

### Utseende

Sitter alltid med vingene slått sammen formet som et blad. Hunnen er blek grønnhvit, hannen sitrongul. Begge har oransje midtflekker.

Vingespenn 55-60 mm.

### Lokalitet

Flyr både i løv- og barskog om våren. På sensommeren finnes den ofte på dyrket mark.



## Rapssommerfugl

### Utseende

På oversiden er vingene hvitaktige med grå skjell og gulaktig skjær. Hunnen har mørkere tegninger enn hannene. De har også en ekstra svart flekk på forvingen. Undersiden av bakvingene er trukket opp med grønne striper.

Vingespenn 37-47 mm.

### Lokalitet

Hager, fuktige enger og grøfter, skog og veikant.



## Dagpåfugløye

### Utseende

Fire store øyeflekker på vingene. Disse er plassert på rødbrun bakgrunn, som også har nyanser av blått, svart, hvitt, og gult. Undersiden er nesten svart.

Vingespenn 52-63 mm.

### Lokalitet

Marker, enger og hager, veikanter og skogrydninger.



## Neslesommerfugl

### Utseende

Oransje og svart med en rad av blå halvmåneformete flekker rundt både for- og bakvingenes kanter. Hvitt merke øverst på hver forvinge. På undersiden er bakvingene mørke.

Vingespenn 35-52 mm.

### Lokalitet

Hager, åker, eng og åpninger i skogen.



## **Admiral**

### **Utseende**

Knallrøde bånd tvers over forvingene, som på oversiden er svarte med hvite flekker. Bakvingene har rødoransje bånd langs kantene. På undersiden har vingene et spraglete mønster av svart, brunt og blått.

**Vingespenn** 52-62 mm.

### **Lokalitet**

Marker, enger, frukthager og i blomsterrike områder.



## **Vanlig blåvinge**

### **Utseende**

Hannen og hunnen er ulike. Hannen har lyseblå vinger. Hunnen har blå og brune vinger med en rad av oransje flekker langs kantene. Begge kjønn har hvit rand rundt vingene og lysebrun og prikkete underside.

**Vingespenn** 21-33 mm.

### **Lokalitet**

Blomsterrike enger og bakker.



## **Oransjegullvinge**

### **Utseende**

Hannen har ensfargede, gyldenrøde vinger med mørk bord langs kantene. Hunnen har oransje forvinger med et sterkt innslag av svarte flekker og mørke bakvinger med et oransje, bredt bånd. Grågul underside hos begge kjønn.

**Vingespenn** opp til 34 mm.

### **Lokalitet**

Blomsterenger og langs veikanter.



## **Grønnvinge**

### **Utseende**

Brun overside. På undersiden har vingene en skinnende grønnfarge. Det går en rad med hvite flekker nedover undersiden.

**Vingespenn** 20-26 mm.

### **Lokalitet**

Buskvegetasjon, åpne skogområder langs stier, myr og lynchheier.



## **Aglajaperlemorvinge**

### **Utseende**

Oransjebrun overside med svarte streker og flekker. Undersiden har ovale perlemorflekker på grønn bunn.

**Vingespenn** 40-60 mm.

### **Lokalitet**

Åpne steder i skogen, langs landeveier, på heier og setervoller i fjellet.



## **Fløyelringvinge**

### **Utseende**

Mørkebrun overside med oransje kantbånd med svarte flekker. Undersiden mørk med tre øyeringer og en hvit stripe. Hvit kant på nyklekte eksemplarer.

**Vingespenn** 40-50 mm.

### **Lokalitet**

Åpent terreng, helst i skogstrakter med bartrær.

